Lo que se ve en el paisaje es sólo el exterior del karst

La disolución de las rocas y los procesos kársticos generan huellas en el paisaje con diferentes denominaciones

Un **bogaz o callejón** se forma cuando las aguas de lluvia disuelven preferentemente la roca por sus planos verticales más débiles, ya sean fisuras o fracturas.

En un **sumidero** el agua de un río se introduce directamente en una cavidad.

Una **cueva** es el acceso horizontal hacia el mundo subterráneo. Suelen deberse a antiguas entradas (sumideros) o salidas de aguas (surgencias), o bien a colapsos de las bóvedas de galerías interiores, o a retrocesos de ladera que, poco a poco, seccionan antiguas galerías.



Las **simas, torcas y silos** son entradas con caída vertical hacia el interior del mundo subterráneo. Suelen deberse bien a zonas con mucha infiltración de agua, o bien a colapsos de bóvedas de los conductos interiores, ya sean horizontales o verticales.

Una **dolina** se forma por la disolución del suelo por el agua de lluvia. Tienen formas redondeadas o en embudo, en cuyo fondo se acumulan sedimentos arcillosos.

Los **poljes** son depresiones de grandes dimensiones con fondos planos en los que se depositan las arcillas presentes en las calizas y que no son disueltas por las aguas. Suele circular el agua de un extremo a otro, con inundaciones estacionales.

Una **dolina de colapso o torca** se forma al hundirse o ceder la bóveda de algún conducto o sala subterráneo.

Al nacimiento de un río en un mácizo kárstico se le denomina **surgencia,** o resurgencia, si antes hubo un sumidero previo.

Los **puentes o arcos naturales** son formas residuales de antiguos conductos a los que la erosión prácticamente ha hecho desaparecer por completo.

Las **fallas abiertas** favorecen la disolución de la roca por el agua que se infiltra por ellas, pudiendo generar formas verticales de centenares de metros de longitud y varias decenas de profundidad.

El **lapiaz o lenar** se produce por la disolución superficial de la roca, creándose acanaladuras y aristas de formas muy diversas que pueden llegar a tener más de 10 m de profundidad.

Una **uvala** se forma cuando se unen varias dolinas. Pueden superar los cien metros de longitud. Las navas, tan características de nuestros paisajes, nunca han tenido circulación entre sus extremos porque siempre han sido grandes áreas de infiltración.

Los **cañones y gargantas** se forman por ríos externos al karst, que seccionan los macizos calcáreos. Los de menor entidad, pueden ser debidos al hundimiento de bóvedas de antiguas galerías. Con pocas lluvias pueden llegar a secarse superficialmente, alimentando directamente el acuífero subterráneo.

En los climas tropicales se originan los **mogotes, hums o cerros residuales.** Son muy conocidos los de China, representados desde hace siglos en las acuarelas típicas de Guilin, Vietnam o Cuba *(No dibujado)*.